

Akupunktur steril (Einwegmaterial)/beim Arzt oder gegen. Vorlage eines Attests	Spendefähig
Akupunktur, fragliche Sterilität	Sperre für 4 Monate
Verweilnadeln, reizlos (Einwegmaterial)	1 Woche nach Entfernung
Allergie Neurodermitis/Atopie mit ausgeprägtem endogenem Ekzem an der Punktionsstelle oder an anderen Körperteilen	Ärztliche Beurteilung Nicht spendefähig
Ausgeheilte Neurodermitis	Spendefähig
Pollinosis/Heuschnupfen mit ausgeprägter Symptomatik zum Spendezeitpunkt	Nicht spendefähig
AIDS-Risiko	s.a. Risikogruppen
Alkoholismus Akut alkoholisierte Personen Bestehende Alkoholkrankheit	Nicht spendefähig Nicht spendefähig
Asthma bronchiale	Ärztliche Beurteilung
Arbeitsunfähigkeit abhängig von der Erkrankung	Ärztliche Beurteilung
Auslandsaufenthalte Beurteilung nach aktuell gültigem Handbuch Reisemedizin! Aufenthalte (>6 Monate) in Gebieten mit vergleichsweise starker Ausbreitung von HBV, HCV, HIV oder HTLV I/II, z.B. Afrika südlich der Sahara, Karibik, Südostasien, Südamerika	Sperre für 4 Monate nach letztem Aufenthalt dann spendefähig
Nach kurzem Aufenthalt in o. g. Gebieten	Ärztliche Beurteilung
Personen, die in einem Malaria-Endemiegebiet geboren oder aufgewachsen sind oder, die sich kontinuierlich über mehr als 6 Monate in einem Malaria-Endemiegebiet aufgehalten hatten	Sperre für 4 Jahre nach Verlassen der Endemie Region
nach Besuch eines Malaria-Endemiegebietes (muss individuell erfragt werden!)	Sperre für mindestens 6 Monate
nach Verlassen eines Gebietes mit saisonal fortlaufender Übertragung des Westnil-Virus auf Menschen (Nordamerika, Mexiko und einige europäische Länder: bitte erfragen!)	Für 4 Wochen gesperrt
Nach Verlassen eines Gebietes mit erhöhtem Risiko-Übertragung von Zika-Virus /bitte erfragen!	Für 4 Wochen nach Rückkehr gesperrt
Nach Aufenthalt in einem Risiko-Gebiet für Übertragung von Chikungunya Virus /bitte erfragen!	Für 2 Wochen gesperrt
Aufenthalt in Großbritannien zwischen 01.01.1980 und 31.12.1996 insgesamt mehr als 6 Monate; nach einer Operation und/oder Transfusionen (Blutkomponenten) im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland nach dem 01.01.1980	Dauersperre
Autoimmunkrankheiten	Ärztliche Beurteilung
Creutzfeld-Jakob-Krankheit , nvCJK Erkrankung, Verdacht auf Creutzfeld-Jakob-Krankheit; Personen mit dem Risiko der Übertragung spongiformer Enzephalopathien (TSE)	Dauersperre
Diabetes Nicht insulinpflichtig, gute Einstellung mit Diät, keine Komplikationen	Spendefähig
Nicht insulinpflichtig, gute Einstellung mit Diät und Biguaniden (Metformin), keine Komplikationen	Ärztliche Beurteilung
Die Einstellung mit sonstigen Medikamenten/Insulins	Dauersperre
Drogen / Suchterkrankungen aktuell drogen-, rauschgiftsüchtig oder dessen begründet verdächtig	Dauersperre
jedemal Drogen gespritzt oder geschnupft	Dauersperre

früherer Gebrauch oraler oder inhalativer Drogen	Ärztliche Beurteilung evtl. Drogentest
Durchfallerkrankungen	Sperre für 4 Wochen bei Beschwerdefreiheit
Durchstechen der Haut zur Befestigung von Schmuck (Piercing , z.B. Ohr, Nase usw.)	4 Monate Sperre
Entmündigung (Pflegschaft, verminderte Geschäftsfähigkeit)	Dauersperre
Epilepsie	Dauersperre
Fieber	Nicht spendefähig Rückstellung für 4 Wochen
Frakturen	Ärztliche Beurteilung
Gewicht >140 und <50 kg	Nicht spendefähig
Hämophilie	Nicht spendefähig
Hepatitis Hepatitis A, nach Ausheilung Hepatitis B, nach Ausheilung	Sperre 4 Monate Sperre 4 Monate
Chronische Hepatitis B und HbsAg-Trägerstatus; Hepatitis C in der Anamnese, unabhängig davon, ob Krankheitserscheinungen aufgetreten sind und/oder eine Therapie notwendig ist	Dauersperre
Hepatitis unklarer Genese in der Anamnese	Dauersperre
Hepatitiskontakt bei unklarer Hepatitisgenese	Sperre für 4 Monate
Soziale Kontakte mit Hep.-B- und -C-Erkrankten	Spendefähig
In einem Haushalt lebend mit Hepatitis-B- oder C-Erkrankten	Sperre 4 Monate
Intime Kontakte mit Hep.-B-C-Erkrankten oder mit Personen mit einem gegenüber der Allgemeinbevölkerung deutlich erhöhtem Risiko für eine HBV-, HCV-, HIV-Infektion	Ab letzter Exposition 4 Monate Sperre
Herpes labialis	Nach trockener Abheilung spendefähig
Herzerkrankungen Herzinfarkt oder CHK/Herzgefäßerkrankung	Dauersperre
Herzschrittmacher	Dauersperre
Schwere Herzfehler, angeborene und erworbene	Dauersperre
Schwere Herzrhythmusstörungen, organisch bedingt	Dauersperre
Herzbeschwerden z.B. geringgradige (Sinus-) Arrhythmie, Roemheld-Syndrom, Herzbeschwerden „nervöser“, „neurotischer“, „vegetativer“ Art	Ärztliche Beurteilung evtl. kardiologisches Attest erforderlich
Hornhaut-; Hirnhautübertragung	Dauersperre
Identität Eindeutige Prüfung mittels gültigem Lichtbildausweis	Spendefähig
Impfungen	s.a. Formular Impfungen
Infektionskrankheiten nach Ausheilung Ausnahme: unkomplizierter Infekt (Schnupfen, Husten ohne Fieber)	Sperre 4 Wochen Sperre 1 Woche
Isotopendiagnostik	24 Stunden
Lymphknotenschwellungen	Bis zur Abklärung nicht spendefähig
Malariaerkrankung in der Anamnese	Dauersperre

Neurodermitis Remission s.a. Allergie	Spendefähig
Nierenerkrankung	Ärztliche Beurteilung evtl. Vorlage ärztliches Attest erforderlich
Operationen Alle OP-Eingriffe –	<i>spendefähig erst nach Abschluss der Wundheilung!</i>
Kleine, komplikationslose Operationen, <u>nicht septische OP</u>	1 Woche n. Fädenziehen
Mittlere, <u>komplikationslose (!) OP</u>	4 Wochen
Endoskopische Eingriffe/Magen-, Darmspiegelung, Laparoskopie usw.	4 Monaten
Zahnextraktion	1 Woche
Große Operationen und Eingriffe, Gabe von Blutkomponenten nicht auszuschließen	4 Monate
Osteomyelitis chronisch Nach Ausheilung	Dauersperre Sperre für 2 Jahre
Piercing	4 Monate
Rheuma	Ärztliche Beurteilung
Risikoberufe und gefährliche Hobbys dürfen nach der Spende nicht ausgeübt werden für	12 Stunden
Rückfallfieber chronisch persistierende bakterielle Infektionen, wie Brucellose, Fleckfieber und andere Rickettsiosen, Lepra, Rückfallfieber, Meliodose oder Tularämie	Dauersperre
Spendeabstand zwischen zwei Vollblutspenden Frauen mindestens (max. 4 Spenden/Jahr) Männer mindestens (max. 6 Spenden/Jahr)	12 Wochen 8 Wochen
Spendeabstand Thrombozytenapherese/Vollblutspende Maximal 26 THK-Spenden/Jahr	> 2 Wochen
Spendeabstand Plasmapherese/Vollblutspende/Thrombozytenapherese Maximal 45-Spenden/Jahr	48 Stunden
Schwangerschaft, Entbindung, Stillzeit Abort bzw. Interruptio Entbindung Schwangerschaft, Stillzeit	6 Monate 6 Monate Nicht spendefähig
Sprachkenntnisse Voraussetzung für eine wirksame Einwilligung ist ein ausreichendes Sprachverständnis für die Spenderaufklärung, die schriftliche und mündliche Vorbefragung und im Besonderen für die Komplexität des vertraulichen Selbstausschlusses. Die Mitwirkung von Dritten bei der Zulassung z.B. Dolmetschern ist aus Gründen mangelnder Vertraulichkeit <u>nicht zulässig.</u>	
Stichverletzung, fremdblutkontaminiert, Schleimhautkontakte Tierblut ist als Fremdblut einzustufen!	4 Monate
Syphilis, Erkrankung, Zustand nach	Dauersperre

Tätowierung auch Permanent-Make-Up	Sperre für 4 Monate
Thrombose	Ärztliche Beurteilung
Tollwutexposition, mögliche Mit Impfung Ohne Impfung und ohne Krankheitssymptome	Sperre für 12 Monate Ärztliche Beurteilung
Transfusion Blutkomponenten und Plasmaderivate sowie Eigenblut	Sperre für 4 Monate
Transplantate Humanen Ursprungs Xenotransplantate (z.B. Frischzellen, Inselzellen tierischen Ursprungs)	Dauersperre Dauersperre
Tuberkulose	Dauersperre
Tumor Maligne Tumore <u>Ausnahme:</u> ausgeheilte Basaliome oder Plattenepithel-Ca der Haut	Dauersperre
Benigne Tumore (Lipome, Uterusmyome)	Spendefähig
Zerebrale Tumore, benigne und maligne	Dauersperre
Wachstumshormone Behandlung ab 01.01.1993	Spendefähig
Wunden	Ärztliche Beurteilung
Zahnbehandlung Zahnextraktion, Parodontose-, Wurzelbehandlung Entzündliche Veränderung, nach Therapie (z.B. Wurzelspitzenresektion) Füllung	Sperre für 1 Woche Sperre für 4 Wochen Spendefähig
Zeckenbiss Erkrankung, Zustand nach Infektion mit B.recurrentis	Dauersperre
Infektion mit B. burgdorferi („Lyme-Borreliose“)	Ärztliche Beurteilung
Nach Zeckenbiss Vorlage des Laborbefundes /Antikörpertest erforderlich! Nach Antibiose	Sperre für 4 Wochen