

<b>Akupunktur</b> steril (Einwegmaterial)/beim Arzt oder gegen Vorlage eines Attests	Spendefähig
Akupunktur, fragliche Sterilität	Sperre für 4 Monate
Verweilnadeln, reizlos (Einwegmaterial)	1 Woche nach Entfernung
<b>Allergie</b> Neurodermitis/Atopie mit ausgeprägtem endogenem Ekzem an der Punktionsstelle oder an anderen Körperteilen	Ärztliche Beurteilung Nicht spendefähig
Ausgeheilte Neurodermitis	Spendefähig
Pollinosis/Heuschnupfen mit ausgeprägter Symptomatik zum Spendezeitpunkt	Nicht spendefähig
<b>AIDS-Risiko</b>	s.a. Risikogruppen
<b>Alkoholismus</b> Akut alkoholisierte Personen Bestehende Alkoholkrankheit	Nicht spendefähig Nicht spendefähig
<b>Asthma bronchiale</b>	Ärztliche Beurteilung
<b>Arbeitsunfähigkeit</b> abhängig von der Erkrankung	Ärztliche Beurteilung
<b>Auslandsaufenthalte</b> Beurteilung nach aktuell gültigem Handbuch Reisemedizin! Aufenthalte (länger als 6 Monate) in Gebieten mit vergleichsweise starker Ausbreitung von HBV, HCV, HIV oder HTLV I/II, z.B. Afrika südlich der Sahara, Karibik, Südostasien, Südamerika	Sperre für 4 Monate nach letztem Aufenthalt
Nach kurzem Aufenthalt in o. g. Gebieten	Ärztliche Beurteilung
Personen, die in einem Malaria-Endemiegebiet geboren oder aufgewachsen sind oder die sich kontinuierlich über mehr als 6 Monate in einem Malaria-Endemiegebiet aufgehalten hatten und negativ auf Plasmodium-AK getestet worden sind	Sperre für 4 Jahre nach Verlassen der Endemie Region
nach Besuch eines Malaria-Endemiegebietes (muss individuell erfragt werden!)	Sperre für mindestens 6 Monate
nach Verlassen eines Gebietes mit saisonal fortlaufender Übertragung des Westnil-Virus auf Menschen (Nordamerika, Mexiko und einige europäische Länder: bitte erfragen!)	Für 4 Wochen gesperrt
Nach Verlassen eines Gebietes mit erhöhtem Risiko-Übertragung von Zika-Virus /bitte erfragen!	Für 4 Wochen nach Rückkehr gesperrt
Nach Aufenthalt in einem Risiko-Gebiet für Übertragung von Chikungunya Virus /bitte erfragen!	Für 2 Wochen gesperrt
Aufenthalt in Großbritannien zwischen 01.01.1980 und 31.12.1996 insgesamt mehr als 6 Monate; nach einer Operation und/oder Transfusionen (Blutkomponenten) im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland nach dem 01.01.1980	Dauersperre
<b>Autoimmunkrankheiten</b>	Ärztliche Beurteilung
<b>Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, nvCJK</b> Erkrankung, Verdacht auf Creutzfeldt-Jakob-Krankheit; Personen mit dem Risiko der Übertragung spongiformer Enzephalopathien (TSE)	Dauersperre
<b>Diabetes</b> Nicht insulinpflichtig, gute Einstellung mit Diät, keine Komplikationen	Spendefähig
Nicht insulinpflichtig, gute Einstellung mit Diät und Biguaniden (Metformin), keine Komplikationen	Ärztliche Beurteilung
Die Einstellung mit sonstigen Medikamenten/Insulins	Dauersperre
<b>Drogen / Suchterkrankungen</b> aktuell drogen-, rauschgiftsüchtig oder dessen begründet verdächtig	Dauersperre

jemals Drogen gespritzt oder geschnupft	Dauersperre
früherer Gebrauch oraler oder inhalativer Drogen	Ärztliche Beurteilung evtl. Drogentest
<b>Durchfallerkrankungen</b>	Sperre für 4 Wochen bei Beschwerdefreiheit
<b>Durchstechen der Haut</b> zur Befestigung von Schmuck ( <b>Piercing</b> , z.B. Ohr, Nase usw.)	4 Monate Sperre
<b>Entmündigung</b> (Pflegschaft, verminderte Geschäftsfähigkeit)	Dauersperre
<b>Epilepsie</b>	Dauersperre
<b>Fieber</b>	Nicht spendefähig Rückstellung für 4 Wochen
<b>Frakturen</b>	Ärztliche Beurteilung
<b>Gewicht</b> >140 und <50 kg	Nicht spendefähig
<b>Hämophilie</b>	Nicht spendefähig
<b>Hepatitis</b> Hepatitis A, nach Ausheilung Hepatitis B, nach Ausheilung	Sperre 4 Monate Sperre 4 Monate
Chronische Hepatitis B und HbsAg-Trägerstatus; Hepatitis C in der Anamnese, unabhängig davon, ob Krankheitserscheinungen aufgetreten sind und/oder eine Therapie notwendig ist	Dauersperre
Hepatitis unklarer Genese in der Anamnese	Dauersperre
Hepatitiskontakt bei unklarer Hepatitisgenese	Sperre für 4 Monate
Soziale Kontakte mit Hep.-B- und -C-Erkrankten (Ausnahme: enge Kontakte innerhalb einer häuslichen Lebensgemeinschaft)	Spendefähig
In einem Haushalt lebend mit Hepatitis-B- oder C-Erkrankten	Sperre 4 Monate nach letztem Kontakt
Intime Kontakte mit Hep.-B-C-Erkrankten oder mit Personen mit einem gegenüber der Allgemeinbevölkerung deutlich erhöhtem Risiko für eine HBV-, HCV-, HIV-Infektion	Ab letzter Exposition 4 Monate Sperre
<b>Herpes labialis</b>	Nach trockener Abheilung spendefähig
<b>Herzerkrankungen</b> Herzinfarkt oder CHK/Herzgefäßerkrankung	Dauersperre
Herzschrittmacher	Dauersperre
Schwere Herzfehler, angeborene und erworbene	Dauersperre
Schwere Herzrhythmusstörungen, organisch bedingt	Dauersperre
Herzbeschwerden z.B. geringgradige (Sinus-) Arrhythmie, Roemheld-Syndrom, Herzbeschwerden „nervöser“, „neurotischer“, „vegetativer“ Art	Ärztliche Beurteilung evtl. kardiologisches Attest erforderlich
<b>Hornhaut-; Hirnhautübertragung</b>	Dauersperre
<b>Identität</b> Eindeutige Prüfung mittels gültigem amtlichen Lichtbildausweis	Spendefähig
<b>Impfungen</b>	s.a. Formular Impfungen
<b>Infektionskrankheiten</b> nach Ausheilung Ausnahme: unkomplizierter Infekt (Schnupfen, Husten ohne Fieber)	Sperre 4 Wochen Sperre 1 Woche
<b>Isotopendiagnostik</b>	24 Stunden

<b>Lymphknotenschwellungen</b>	Bis zur Abklärung nicht spendefähig
<b>Malariaerkrankung</b> in der Anamnese	Dauersperre
<b>Neurodermitis</b> Remission s.a. Allergie	Spendefähig
<b>Nierenerkrankung</b>	Ärztliche Beurteilung evtl. Vorlage ärztliches Attest erforderlich
<b>Operationen</b> Alle OP-Eingriffe –	spendefähig erst nach Abschluss der Wundheilung!
Kleine, komplikationslose Operationen, <u>nicht septische</u> OP	1 Woche n. Fädenziehen
Mittlere, <u>kompliationslose</u> (!) OP	4 Wochen
<b>Endoskopische Eingriffe</b> /Magen-, Darmspiegelung, Laparoskopie usw.	4 Monaten
<b>Zahnextraktion</b>	1 Woche
Große Operationen und Eingriffe, Gabe von Blutkomponenten nicht auszuschließen	4 Monate
<b>Osteomyelitis</b> chronisch Nach Ausheilung	Dauersperre Sperre für 2 Jahre
<b>Piercing</b> auch Ohrlöcher, transdermale Implantate, Cutting, Branding	4 Monate
<b>Rheuma</b>	Ärztliche Beurteilung
<b>Risikoberufe</b> und gefährliche Hobbys dürfen nach der Spende nicht ausgeübt werden für	12 Stunden
<b>Rückfallfieber</b> chronisch persistierende bakterielle Infektionen, wie Brucellose, Fleckfieber und andere Rickettsiosen, Lepra, Rückfallfieber, Meloidose oder Tularämie	Dauersperre
<b>Spendeabstand zwischen zwei Vollblutspenden</b> Frauen mindestens (max. 4 Spenden/Jahr) Männer mindestens (max. 6 Spenden/Jahr)	12 Wochen 8 Wochen
<b>Spendeabstand Thrombozytenapherese/Vollblutspende</b> Maximal 26 THK-Spenden/Jahr	> 2 Wochen
<b>Spendeabstand Plasmapherese/Vollblutspende/Thrombozytenapherese</b> Maximal 60 Spenden/Jahr Cave: Jahresgesamtmenge (Männer 3000 ml, Frauen 2000 ml Blut) darf nicht überschritten werden!	2 volle Kalendertage
<b>Schwangerschaft, Entbindung, Stillzeit</b> Abort bzw. Interruptio Entbindung Schwangerschaft, Stillzeit	6 Monate 6 Monate Nicht spendefähig
<b>Sprachkenntnisse</b> Voraussetzung für eine wirksame Einwilligung ist ein ausreichendes Sprachverständnis für die Spenderaufklärung, die schriftliche und mündliche Vorbefragung und im Besonderen für die Komplexität des vertraulichen Selbstausschlusses. Die Mitwirkung von Dritten bei der Zulassung z.B. Dolmetschern ist aus Gründen mangelnder	

Vertraulichkeit <u>nicht zulässig.</u>	
<b>Stichverletzung</b> , fremdblutkontaminiert, Schleimhautkontakte Tierblut ist als Fremdblut einzustufen!	4 Monate
<b>Syphilis</b> , Erkrankung, Zustand nach	Dauersperre
<b>Tätowierung</b> auch Permanent-Make-Up	Sperre für 4 Monate
<b>Thrombose</b>	Ärztliche Beurteilung
<b>Tollwutexposition, mögliche</b> Mit Impfung Ohne Impfung und ohne Krankheitssymptome	Sperre für 12 Monate Ärztliche Beurteilung
<b>Transfusion</b> Blutkomponenten und Plasmaderivate sowie Eigenblut	Sperre für 4 Monate
<b>Transplantate</b> Humanen Ursprungs Xenotransplantate (z.B. Frischzellen, Inselzellen tierischen Ursprungs)	Dauersperre Dauersperre
<b>Tuberkulose</b>	Dauersperre
<b>Tumor</b> Maligne Tumore Ausnahme: ausgeheilte Basaliome oder Plattenepithel-Ca der Haut	Dauersperre
Benigne Tumore (Lipome, Uterusmyome)	Spendefähig
Zerebrale Tumore, benigne und maligne	Dauersperre
<b>Wachstumshormone</b> Behandlung ab 01.01.1993	Spendefähig
<b>Wunden</b>	Ärztliche Beurteilung
<b>Zahnbehandlung</b> Zahnextraktion, Parodontose-, Wurzelbehandlung Entzündliche Veränderung, nach Therapie (z.B. Wurzelspitzenresektion) Füllung Professionelle Zahnreinigung	Sperre für 1 Woche Sperre für 4 Wochen  Spendefähig Sperre für 1 Tag
<b>Zeckenbiss</b> Erkrankung, Zustand nach Infektion mit B.recurrentis	Dauersperre
Infektion mit B. burgdorferi („Lyme-Borreliose“)	Ärztliche Beurteilung
Nach Zeckenbiss Vorlage des Laborbefundes /Antikörpertest erforderlich! Nach Antibiose	Sperre für 4 Wochen