

Rückstellkriterien bei Medikamenteneinnahme

 ID: 20929
Formular

Orale Kontrazeptiva	spendefähig
Schilddrüsenhormone	spendefähig
Vitamine	spendefähig
Pflanzliche Immunstimulanzen	spendefähig
Homöopathie	spendefähig
Minipille	gefährdeter Konzeptionsschutz bei Plasma/Multi-Spenden weniger als 3 Stunden nach der Einnahme!
Blutdruckmedikamente Antihypertensiva (bei gut eingestelltem Blutdruck) <u>aber:</u> nicht zu Therapiebeginn oder bei Umstellung! Rasilex (teratogen, lange HWZ)	Spendefähig, nach Entscheidung des Arztes Sperrung für 4 Wochen
Antihypotonika (Blutdrucksteigernde Medikamente, Kreislaufmedikation)	Sperrung während der Medikamenteneinnahme
Diuretika „Wassertabletten“	nach Entscheidung des Arztes
Orale Antidiabetika : Biguanide (Metformin) übrige Antidiabetika	spendefähig Dauersperrung
Betrifft nur Thrombozytenspende : Acetylsalicylsäurehaltige Analgetika , andere Thrombozytenaggregationshemmer z.B. Alka-Seltzer®, Aspirin+C®, Spalt®, ASS 100 Nichtsteroidale Antiphlogistika : Ibuprofen, Diclofenac Cave: Grunderkrankung!	Sperre bis zu 10 Tagen nach letzter Einnahme für Thrombozytenspender zwingend Sperre bis zu 72 Stunden nach letzter Einnahme für Thrombozytenspender zwingend
Milde Analgetika ohne ASS-Gehalt	nach Entscheidung des Arztes
Lipid- und harnsäuresenkende Medikamente	spendefähig
H2-Blocker (wenn keine blutenden Ulcera)	spendefähig
Antirheumatika NSAR (Ibuprofen, Diclo) NSAR (Pirazolonverbindungen, Phenylbutazonverbindungen, Lornoxicam, Meloxicam, Piroxicam) D-penicillamin, Goldderivate Cave: Grunderkrankung!	s.o. nach Entscheidung des Arztes Dauersperrung, teratogen (fruchtschädigend)
Antibiotika Antihelminthika (z.B. Pyrantel)	Sperre für 4 Wochen Sperre für 4 Wochen
Antimykotika „Pilzmittel“ (systemische Anwendung) Lokale Anwendung	Sperre für 4 Wochen spendefähig/Entscheidung des Arztes
Antikoagulantien (Blutverdünnende Mittel): Cumarinderivate, Phenprocoumon (Marcumar), Warfarin, Heparine Embolex, Arixtra Cave: Grunderkrankung!	Sperre für 4 Wochen oder nach Entscheidung des Arztes
Antiallergika	nach Entscheidung des Arztes
Psychopharmaka : Johanniskraut, Echinacin, Hypnotika, Tranquilizer Trizyklische Antidepressiva, Neuroleptika	spendefähig nach Entscheidung des Arztes

Rückstellkriterien bei Medikamenteneinnahme

 ID: 20929
Formular

Koronartherapeutika (Herzmedikamente)	nach Entscheidung des Arztes
Parkinsonmittel Restless-legs-Syndroms Morbus Parkinson	nach Entscheidung des Arztes nicht spendefähig
Organpräparate tierischer Herkunft (parenterale Anwendung - NeyChondrin) orale Anwendung	12 Monate Sperre spendefähig
Aknetherapeutika Retinoide (Isotretinoin-Aknefug Iso, Aknenormin, Isoderm, Isotret, Roaccutan; Tretinoin-Airol, Vesanoid)	Sperre für 4 Wochen teratogen (fruchtschädigend)
Dermatika Alopeziemittel: Finasterid (Propecia, Proscar) Psoriasisstherapeutika: Vitamin-A-Derivate (Akitretin-Neotigason*, Methoxsalen-Meladinin)	Sperre für 4 Wochen Sperre für 3 Jahre / bleibt Monate nach Absetzen teratogen (fruchtschädigend)
Kortikosteroide (Kortison) (systemische Anwendung)	Sperre für 4 Wochen
Kortikosteroide (topische oder inhalative Anwendung)	nach Entscheidung des Arztes
Schilddrüsenstherapeutika: L-Thyroxine Thyreostatika (Carbimazol) Cave: Grunderkrankung!	spendefähig Sperre für 4 Wochen
Potenzmittel Sildenafil (Viagra)	spendefähig
Insulin	Dauersperre
Virostatika Oseltamivir (Tamiflu), Zanamivir (Relenza)	Sperre für 4 Wochen
Medikamente mit Einfluß auf Releasing Hormone (Tamoxifen, SERMS-Evista®)	nicht spendefähig
Zytostatika Cyclophamid (Endoxan)	Dauersperre
Wachstums- oder Infertilitätsbehandlung mit Hypo- physenhormonen <u>nicht gentechnologischen</u> Ursprungs	Dauersperre
Anabolika	Sperre für 4 Monaten
Zweifelsfragen und Medikamentenkombinationen	nach Entscheidung des Arztes