

Als Blutspender auf Dauer auszuschließen sind Personen,

- die HCV*- oder HIV*-krank sind.
- bei denen eine HCV- oder HIV-Infektion nachgewiesen wurde, unabhängig davon ob Krankheitserscheinungen aufgetreten sind.
- die Empfänger von Gerinnungsfaktorkonzentraten (z.B. Hämophiliekranken) sind

Von der Blutspende zeitlich begrenzt zurückzustellen sind Personen,

- die einer Gruppe mit einem gegenüber der Allgemeinbevölkerung deutlich erhöhten Risiko für eine HBV*-, HCV-, HIV- Infektion angehören oder dieser zugeordnet werden müssen. (Männer die Sexualverkehr mit anderen Männern haben (MSM), Drogenabhängige, männliche und weibliche Prostituierte, heterosexuelle Personen mit sexuellem Risikoverhalten, z.B. Geschlechtsverkehr mit häufig wechselnden Partnern) für 12 Monaten
- die intimen Kontakt mit Personen hatten, die einer Gruppe mit erhöhtem Infektionsrisiko für HBV und HCV und/oder HIV angehören (Drogenabhängige, männliche und weibliche Prostituierte, hetero-sexuelle Personen mit sexuellem Risikoverhalten, z.B. Geschlechtsverkehr mit häufig wechselnden Partnern oder mit bisexuellen Männern) für 4 Monate
- die in den letzten 4 Monaten Strafgefangene waren oder sind (Freigänger)
- die in den letzten 4 Monaten ungeschützten Intimkontakte mit einem neuen Partner hatten.
Da ein neuer Sexualpartner ein neues Expositionsrisiko für den Erwerb von transfusions-relevanten Infektionskrankheiten nach sich zieht erfolgt die Rückstellung der Spender nach ungeschütztem Intimkontakt für den Zeitraum der möglichen Infektionsfensterphase (aktuell 4 Monate).
- die aus einem Gebiet eingereist sind, in dem sie ihren zeitweiligen Lebensmittelpunkt hatten und in dem sich HBV-, HCV-, HIV, oder HTLV-I/II- Infektionen vergleichsweise stark ausgebreitet hat: z.B. Afrika südlich der Sahara, Karibik, Südostasien, Südamerika, für 4 Monate nach dem letzten Aufenthalt. Die Zulassung zur Spende nach kurzen Aufenthalten kann nach ärztlicher Beurteilung erfolgen.
- die intimen Kontakte mit o.g. Personen nach Einreise aus einem Endemiegebiet hatten für 4 Monate

Spender, die AIDS-assoziierte Symptome aufweisen, dürfen nicht zur Spende zugelassen werden:

- Unklarer Gewichtsverlust von mehr als 5 kg innerhalb von 2 Monaten
- Lymphdrüsenanschwellungen
- Wochenlanges nächtliches Schwitzen, Abgeschlagenheit
- Andauernder, nicht durch Rauchen und eine Erkältung bedingter Husten
- Auffällige Haut- oder Schleimhautveränderungen (z.B. violette Flecken und Beulen, meist schmerzlos, von harter Konsistenz (Kaposi-Sarkom), weiße Beläge im Mund, die nicht verschwinden und auf einen Soorbefall hindeuten können.
- Länger dauernder Durchfall

* HCV- Hepatitis C Virus; HIV-Humanes Immundefizienz Virus; HBV- Hepatitis B Virus