

Rückstellkriterien andere GründeID: 20927
Formular

Abrasio Abrasio (nach Schwangerschaft)	4 Monate (Diagnose?) 6 Monate
Akupunktur steril (Einwegmaterial) /beim Arzt oder gegen Vorlage eines Attests	Spendefähig
Akupunktur, fragliche Sterilität	Sperre für 4 Monate
Verweilnadeln, reizlos (Einwegmaterial)	1 Woche nach Entfernung
Allergie Neurodermitis/Atopie mit ausgeprägtem endogenem Ekzem an der Punktionsstelle oder an anderen Körperteilen	Ärztliche Beurteilung nicht spendefähig
Ausgeheilte Neurodermitis	Spendefähig
Pollinosis/Heuschnupfen mit ausgeprägter Symptomatik zum Spendezeitpunkt	nicht spendefähig
AIDS-Risiko	s.a. Risikogruppen
Alkoholismus Akut alkoholisierte Personen	nicht spendefähig
Bestehende Alkoholkrankheit	nicht spendefähig
Ehemalige Alkoholiker ohne Leberschäden und nach 12-monatiger Abstinenz	spendefähig
Asthma bronchiale	Ärztliche Beurteilung
Arbeitsunfähigkeit abhängig von der Erkrankung	Ärztliche Beurteilung
Auslandsaufenthalte Beurteilung nach aktuellen PEI Vorgaben für Spenderrückstellung! Aufenthalte (länger als 6 Monate) in Gebieten mit vergleichsweise starker Ausbreitung von HBV, HCV, HIV oder HTLV I/II, z.B. Afrika südlich der Sahara, Karibik, Südostasien, Südamerika. Nach kurzem Aufenthalt in o. g. Gebieten.	Sperre für 4 Monate nach letztem Aufenthalt Ärztliche Beurteilung
Personen, die in einem Malaria-Endemiegebiet geboren oder aufgewachsen sind oder die sich kontinuierlich über mehr als 6 Monate in einem Malaria-Endemiegebiet aufgehalten hatten und negativ auf Plasmodien getestet worden sind	Sperre für 3 Jahre nach Verlassen der Endemie Region
nach kurzfristigem (unter 6 Monaten) Besuch eines Malaria-Endemiegebietes (muss individuell erfragt werden!)	Sperre für mindestens 6 Monate
Malaria-Verdacht (unklare Fieberschübe während oder nach dem Aufenthalt in einem Malaria-Endemiegebiet)	12 Monate Sperre, danach spendefähig, falls Test auf Plasmodien neg
Nach Verlassen eines Gebietes mit erhöhter Risiko-Übertragung von Zika-Virus /bitte erfragen!	Für 4 Wochen nach Rückkehr gesperrt
Nach Aufenthalt in einem Risiko-Gebiet für Übertragung von Chikungunya Virus /bitte erfragen!	Für 2 Wochen nach Reiserückkehr gesperrt
Aufenthalt in Großbritannien zwischen 01.01.1980 und 31.12.1996 insgesamt mehr als 6 Monate; nach einer Operation und/oder Transfusionen (Blutkomponenten) im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland nach dem 01.01.1980	Dauersperre

Rückstellkriterien andere Gründe
ID: 20927
Formular

Autoimmunkrankheiten ohne aktuelle Krankheitsaktivität und ohne Medikation. z.B. Vitiligo bzw. gut eingestellte Hormon-Substitution ohne Krankheitsaktivität bei Hashimoto-Thyreoiditis	Ärztliche Beurteilung spendefähig
Borreliose, nach antibiotischer Therapie und Ausheilung	spendefähig, bei negativen IgG; persistierende IgM sind ohne Relevanz
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, nvCJK Erkrankung, Verdacht auf Creutzfeldt-Jakob-Krankheit; Personen mit dem Risiko der Übertragung spongiformer Enzephalopathien (TSE)	Dauersperre
Diabetes mellitus Nicht insulinpflichtig, gute Einstellung mit Diät, keine Komplikationen	spendefähig
Nicht insulinpflichtig, gute Einstellung mit Diät und Biguaniden (Metformin), keine Komplikationen	Ärztliche Beurteilung
Die Einstellung mit sonstigen Medikamenten bzw. Insulins	Dauersperre
Drogen / Suchterkrankungen aktuell drogen-, rauschgiftsüchtig oder dessen begründet verdächtig	Dauersperre
jedemals Drogen gespritzt oder geschnupft	Dauersperre
früherer Gebrauch oraler oder inhalativer Drogen gesicherte langfristige Abstinenz und soziale Integration	Ärztliche Beurteilung evtl. reguläre Kontrolle (Drogentest vor Ort)
Durchfallerkrankungen (infektiöse Genese wahrscheinlich) Salmonellose	Sperre für 4 Wo nach Abklingen der Beschwerden sowie dreimalig negativer Stuhltest nach Salmonellose
Durchstechen der Haut zur Befestigung von Schmuck (Piercing , z.B. Ohr, Nase usw.)	4 Monate Sperre
Entmündigung (Pflegschaft, verminderte Geschäftsfähigkeit)	Ärztliche Beurteilung
Epilepsie	Dauersperre
Endoskopische Eingriffe /Magen-, Darmspiegelung, Laparoskopie auch diagnostisch, Bronchoskopie usw./	4 Monaten
Endoprothese Gelenkersatz (Knie, Hüfte)	4 Monaten
Fieber (> 37,5°C)	nicht spendefähig Rückstellung für 4 Wochen

Rückstellkriterien andere Gründe
ID: 20927
Formular

Frakturen ohne OP mit OP (z.B. Marknagelung)	Ärztliche Beurteilung: Spendefähig nach 4 Wo 4 Monaten
Gewicht >140 und <50 kg	nicht spendefähig
Hämophilie	nicht spendefähig
Hämochromatose ohne Eisenüberladung, maligne Grunderkrankung ausgeschlossen, keine Leberschäden Attest erforderlich.	spendefähig Erhaltungstherapie bei normalen Spende- intervallen
Hepatitis Hepatitis A, nach Ausheilung Hepatitis B, nach Ausheilung Hepatitis E, nach Ausheilung	Sperre 4 Monate Sperre 4 Monate 4 Wochen nach dem letzten pos PCR /negativer PCR-Test vorausgesetzt
Chronische Hepatitis B und HbsAg-Trägerstatus; Hepatitis C Hepatitis D	Dauersperre Dauersperre Dauersperre
Hepatitis unklarer Genese in der Anamnese	Dauersperre
Hepatitiskontakt bei unklarer Hepatitisgenese	Sperre für 4 Monate
Soziale Kontakte mit Hep.-B- und -C-Erkrankten (Ausnahme: enge Kontakte innerhalb einer häuslichen Lebensgemeinschaft)	Spendefähig
In einem Haushalt lebend mit Hepatitis-B- oder C-Erkrankten	Sperre 4 Monate nach letztem Kontakt
Intime Kontakte mit Hep.-B-C-Erkrankten oder mit Personen mit einem gegenüber der Allgemeinbevölkerung deutlich erhöhtem Risiko für eine HBV-, HCV-, HIV-Infektion	ab letzter Exposition 4 Monate Sperre
Herpes labialis	nach trockener Abheilung spendefähig
Herpes zoster (Gürtelrose) vollständige trockene Abheilung	4 Wochen, Sperrfrist von Virusstatika beachten!
Herzerkrankungen Herzinfarkt oder CHK/Herzgefäßerkrankung	Dauersperre
Herzschrillmacher	Dauersperre
Schwere Herzfehler, angeborene und erworbene	Dauersperre
Schwere Herzrhythmusstörungen, organisch bedingt	Dauersperre
Herzbeschwerden z.B. geringgradige (Sinus-) Arrhythmie, Roemheld-Syndrom, Herzbeschwerden „nervöser“, „neurotischer“, „vegetativer“ Art	Ärztliche Beurteilung evtl. kardiologisches Attest erforderlich
Hornhaut-, Hirnhautübertragung	Dauersperre
Hysterektomie	4 Monate (Diagnose?)

Rückstellkriterien andere Gründe
ID: 20927
Formular

Identität Eindeutige Prüfung mittels <u>gültigem</u> amtlichen Lichtbildausweis	spendefähig
Impfungen	s.a. Formular Impfungen
Infektionskrankheiten nach Ausheilung <u>Ausnahme:</u> unkomplizierter Infekt (Schnupfen, Husten ohne Fieber)	Sperre 4 Wochen Sperre 1 Woche
Isotopendiagnostik	24 Stunden
Konisation	4 Wochen (Biopsie? Ds?)
Lymphknotenschwellungen Attest erforderlich!	bis zur Abklärung nicht spendefähig
Malariaerkrankung in der Anamnese nach medizinisch dokumentierter Heilung, vor Spendenzulassung negativer Plasmodien-Nachweis (nach Ablauf der 4 Jahre)	Dauersperre 4 Jahre
Neurodermitis Remission	spendefähig
Nierenerkrankung akute Erkrankung – 4 Wochen (Ausnahme Glomerulonephritis) chronischer Verlauf - Ausschluss Nierensteine ohne Symptomatik - spendefähig	Ärztliche Beurteilung evtl. Vorlage e. ärztlichen Attest erforderlich
Operationen Alle OP-Eingriffe –	erst spendefähig nach Abschluss der Wundheilung!
Kleine, komplikationslose Operationen, <u>nicht septische</u> OP	1 Woche n. Fäden Ziehen
Mittlere, <u>komplikationslose</u> (!) OP	4 Wochen
Große Operationen und Eingriffe unter Vollnarkose, Gabe von Blutkomponenten nicht auszuschließen	4 Monate
Osteomyelitis chronisch Nach Ausheilung, medizinisch dokumentiert	Dauersperre Sperre für 2 Jahre
Piercing auch Ohrlöcher, transdermale Implantate, Cutting, Branding	4 Monate
Rheuma	Ärztliche Beurteilung
Risikoberufe und gefährliche Hobbys dürfen nach der Spende nicht ausgeübt werden für	mindestens 12 Stunden
Rückfallfieber chronisch persistierende bakterielle Infektionen, wie Brucellose, Fleckfieber und andere Rickettsiosen, Lepra, Rückfallfieber, Meloidose oder Tularämie	Dauersperre

Rückstellkriterien andere Gründe
ID: 20927
Formular

Spendeabstand zwischen zwei Vollblutspenden Frauen mindestens (max. 4 Spenden/Jahr) Männer mindestens (max. 6 Spenden/Jahr)	12 Wochen 8 Wochen
Spendeabstand Thrombozytenapherese/Vollblutspende Maximal 26 THK-Spenden/Jahr	≥ 2 Wochen
Spendeabstand Plasmapherese/Vollblutspende/Thrombozytenapherese Maximal 60 Spenden/Jahr Cave: Jahresgesamtmenge (Männer 3000 ml, Frauen 2000 ml Blut) darf nicht überschritten werden!	2 volle Kalendertage
Schwangerschaft, Entbindung, Stillzeit Abort bzw. Interruptio Entbindung Schwangerschaft, Stillzeit	6 Monate 6 Monate nicht spendefähig
Sprachkenntnisse Voraussetzung für eine wirksame Einwilligung ist ein ausreichendes Sprachverständnis für die Spenderaufklärung, die schriftliche und mündliche Vorbefragung und im Besonderen für die Komplexität des vertraulichen Selbstausschlusses. Die Mitwirkung von Dritten bei der Zulassung z.B. Dolmetschern ist aus Gründen mangelnder Vertraulichkeit <u>nicht zulässig</u> .	
Stichverletzung, fremdblutkontaminiert, Schleimhautkontakte Tierblut ist als Fremdblut einzustufen!	4 Monate
Syphilis, Erkrankung, Zustand nach	Dauersperre
Tätowierung, sowie andere kosmetische Eingriffe mit Haut-/Schleimhautverletzung (Cutting, Branding, Permanent-Make-Up)	Sperre für 4 Monate
Thrombose	Ärztliche Beurteilung
Tollwutexposition, mögliche Mit Impfung Ohne Impfung und ohne Krankheitssymptome	Sperre für 12 Monate Ärztliche Beurteilung
Transfusion Blutkomponenten und Plasmaderivate sowie Eigenblut	Sperre für 4 Monate
Transplantate Humanen Ursprungs Xenotransplantate (z.B. Frischzellen, Inselzellen tierischen Ursprungs)	Dauersperre Dauersperre
Tuberkulose	Dauersperre

Rückstellkriterien andere Gründe
ID: 20927
Formular

Tumor	
Maligne Tumore <u>Ausnahme:</u> ausgeheilte Basaliome oder Plattenepithel-Ca der Haut	Dauersperre Attest (Biopsie Befund) vorzulegen!
Benigne Tumore (Lipome, Uterusmyome) Attest!	spendefähig
Zerebrale Tumore, benigne und maligne	Dauersperre
Wachstumshormone	
Behandlung ab 01.01.1993	spendefähig
Wunden	
	Ärztliche Beurteilung
Zahnbehandlung	
Zahnextraktion, Parodontose-, Wurzelbehandlung Entzündliche Veränderung, nach Therapie (z.B. Wurzelspitzen- resektion) Füllung Professionelle Zahnreinigung	Sperre für 1 Woche Sperre für 4 Wochen Spendefähig Sperre für 1 Tag
Zahnimplantat ohne tierisches Material zum Knochenaufbau Zahnimplantat mit Knochenaufbau mit denaturierter tierischer Knochenmatrix	1 Woche 12 Monate
Zeckenbiss	
Erkrankung, Zustand nach Infektion mit B.recurrentis	Dauersperre
Infektion mit B. burgdorferi („Lyme-Borreliose“)	Ärztliche Beurteilung
Nach Zeckenbiss, ohne Symptomen (cave: Babesiose!) Mit Symptomen: ärztliche Entscheidung ggbs. gegen Vorlage des Laborbefundes /Antikörpertest/! Siehe Borreliose . Nach Antibiose	8 Wochen Sperre für 4 Wochen