

Rückstellkriterien bei Impfungen
ID: 20928
Formular

Impfung:	Rückstellzeit
Beriglobin (menschliches Immunglobulin)	4 Monate
Cholera (inaktiviert)	spendefähig*
Cholera Lebendimpfstoff, z.B. Orochol	4 Wochen
COVID-19 Impfung, Impfstoff unabhängig	spendefähig*
Diphtherie	spendefähig*
Diphtherie-Pertussis-Tetanus Impfung	spendefähig*
Fleckfieber	spendefähig*
FSME, aktiv (Prophylaxe), /Zeckenimpfung	spendefähig*
FSME (nach Kontakt)	12 Monate
Gelbfieber, Lebendimpfstoff	4 Wochen
Grippe	spendefähig*
Hämophilus Influenza (HIB)	spendefähig*
Hepatitis A (Havrix®, Vaqta®)	spendefähig*
Hepatitis B (Engerix®) oder Kombi A+B (Twinrix®) oder in den 6-fach Impfungen Hexavac®, Infanrix®	4 Wochen
Herpes zoster (rekombinant, Shingrix®)	spendefähig
Herpes zoster (Lebendimpfstoff, Zostavax®)	4 Wochen
HPV-Impfung	spendefähig*
Hyperimmunglobulingabe (nach Schlangen-, Skorpionbiss, Bakteriengifte=tierische Globuline), Tierseren	12 Monate
Japanische Encephalitis	spendefähig*
Masern	4 Wochen
Meningitis (Meningokokken-Impfung)	spendefähig*
Mumps	4 Wochen
Pertussis (Keuchhusten) Impfung	spendefähig*
Pneumokokken	spendefähig*
Pockenschutzimpfungen mit normaler Impfreaktion	4 Wochen
Pockenschutzimpfungen mit Impfkomplicationen nach Abklingen der Impfreaktionen (bzw. -Komplicationen)**	4 Wochen
Kontaktpersonen von Pockenschutzimpfungen ohne Symptomatik bzw. Hautreaktionen	spendefähig*
Kontaktpersonen von Pockenschutzimpfungen mit Symptomen und Hautreaktionen (nach Abklingen aller Symptome)	4 Wochen
Poliomyelitis oral (Schluckimpfung)	4 Wochen
Poliomyelitis parenteral (inaktiv)	spendefähig*
Röteln	4 Wochen
Tetanus aktiv/passiv (Prophylaxe) z.B. Tetanol®, Merieux® auch Kombis Tetanus-Diphtherie-Pertussis-Polio	spendefähig*
Tetanus passiv (nach Verletzung) z.B. Tetagam®	4 Monate
Tollwut-Prophylaxe (Rabipur®)	spendefähig*
Tollwut-Impfung (bei Verdacht auf Exposition) Immunglobulin	12 Monate
Tuberkulintest (Mendel-Mantoux, Tine-Test) und andere i. c.-Testallergene	1 Woche
Tuberkulose (BCG)	4 Wochen
Typhus (TAB) T (inaktiviert) z.B. Typhim®, Typherix®	spendefähig*
Typhus, Lebendimpfstoff-Schluckimpfung	4 Wochen
Windpocken- (Varizellen-) Impfung Varilrix®	4 Wochen

*Voraussetzung: Beschwerdefreiheit nach der Impfung, dann ist am nächsten Tag eine Spende möglich!

**Für Pockenschutzimpfungen gilt:

Bei Impfungen und Kontaktpersonen mit Haut- oder Schleimhautveränderungen muss die Impf- bzw. Kontaktstelle durch den Spendearzt inspiziert und auf vollständige Abheilung beurteilt werden.