

## Rückstellkriterien für Risikogruppen

ID: 20930  
Formular

### Als Blutspender auf Dauer auszuschließen sind

- Personen, bei denen eine der folgenden Infektionen nachgewiesen wurde:
  - HIV\*-1 oder HIV-2 (unabhängig von einer antiretroviralen Therapie),
  - HBV\*, Ausnahme: ausgeheilte HBV-Infektion (nur unter bestimmten Bedingungen),
  - HCV\*,
  - HTLV\* Typ 1 oder Typ 2 (HTLV-1/-2),
  - Syphilis
- Personen, die Drogen konsumieren oder Medikamente missbräuchlich zu sich nehmen, oder bei denen ein begründeter Verdacht dessen besteht.

### Von der Blutspende zeitlich begrenzt zurückzustellen sind Personen,

- mit einem Sexualverhalten, dass ein innerhalb der letzten **4 Monate** deutlich erhöhtes Übertragungsrisiko für durch Blut übertragbare schwere Infektionskrankheiten birgt, **für 4 Monate**
  - Sexualverkehr mit insgesamt mehr als zwei Personen,
  - Sexualverkehr mit einer neuen Person, sofern Analverkehr praktiziert wurde,
  - Sexualverkehr mit insgesamt mehr als einer Person, sofern Analverkehr praktiziert wurde,
  - Sexualverkehr mit einer Person, die mit HBV\*, HCV\* oder HIV\* infiziert ist.
  - Sexualverkehr mit einer Person, die in einem Endemiegebiet/Hochprävalenzland für HBV-, HCV oder HIV lebt oder von dort eingereist ist.
- die aus einem Gebiet eingereist sind, in dem sie sich länger als 6 Monate aufgehalten haben, und in dem sich HBV\*, HCV\*, HIV\* oder HTLV-I/II\*- Infektionen vergleichsweise stark ausgebreitet hat: z.B. Afrika südlich der Sahara, Karibik, Südostasien, Südamerika und Karibik, **für 4 Monate nach dem letzten Aufenthalt**. Die Zulassung zur Spende nach kurzen Aufenthalten kann nach ärztlicher Beurteilung erfolgen,
- während einer Haft und nach Haftentlassung **für 4 Monate**,
- bei engen Kontakten innerhalb einer häuslichen Lebensgemeinschaft mit dem Risiko einer Infektion mit Hepatitisviren (HBV\*, HCV\*, HAV\*) **für 4 Monaten nach letztem Kontakt**,
- nach Einnahme einer medikamentösen HIV-Präexpositionsprophylaxe **für 4 Monate**.

### Personen, die AIDS-assoziierte Symptome aufweisen, dürfen nicht zur Spende zugelassen werden:

- Unklarer Gewichtsverlust von mehr als 5 kg innerhalb von 2 Monaten,
- Lymphdrüsenanschwellungen,
- wochenlanges nächtliches Schwitzen, Abgeschlagenheit,
- andauernder, nicht durch Rauchen und eine Erkältung bedingter Husten,
- auffällige Haut- oder Schleimhautveränderungen (z.B. violette Flecken und Beulen, meist schmerzlos, von harter Konsistenz (Kaposi-Sarkom), weiße Beläge im Mund, die nicht verschwinden und auf einen Soorbefall hindeuten können,
- länger andauernder Durchfall.

\* HCV = Hepatitis C Virus; HIV = Humanes Immundefizienz-Virus; HBV = Hepatitis B Virus;  
HAV = Hepatitis A Virus; HTLV = Humanes T-Zell-Leukämievirus